Table 10. Mean seasonal in vitro dry matter digestibility (%) of key forage species, Jarbidge Mountains, Nevada, 1999.

Species	June		August		Autumn	
	$\bar{x}$	SE	$\bar{x}$	SE	$\bar{x}$	SE
Forbs	78.1	2.1	68.3	1.2	57.0	0.9
Arrowleaf balsamroot	77.5	0.9	68.8	2.3	57.0	1.9
Lupine spp.	78.7	4.6	67.7	1.3	57.0	0.7
Grasses	67.5	1.3	57.8	1.6	54.6	1.4
Bluebunch wheatgrass	65.0	4.1	58.5	2.4	49.1	3.7
Kentucky bluegrass	67.1	1.0	55.3	4.3	53.4	1.7
Idaho fescue	66.2	2.9	61.2	4.2	53.1	3.7
Mountain brome	76.4	0.7	66.7	1.9	50.1	2.0
Needlegrass spp.	66.9	1.8	52.5	0.8	42.0	2.2
Sandberg's bluegrass	63.5	1.5	52.9	4.1	47.2	3.7
Woody Plants	67.5	3.7	63.0	2.1	61.7	1.3
Curlleaf mountain mahogany	57.6	4.4	55.7	2.2	58.0	0.7
Mountain snowberry	79.8	2.5	68.6	1.5	62.0	1.8
Snowbrush ceanothus	65.1	3.2	64.7	1.7	65.3	1.9